

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza
 Direttore: **Dr.ssa Maria Teresa Padovan**

INDICAZIONI SANITARIE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA IN CASO DI ALLAGAMENTI

L'Azienda Ulss 8 Berica raccomanda ai cittadini di **utilizzare indumenti e mezzi protettivi** (guanti, stivali) in tutti i casi in cui si dovesse avere contatto con le acque da allagamento, durante le operazioni di pulizia.

OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI

È importante seguire la seguente scaletta di interventi:

1. pulizia fisica e meccanica delle superfici con abbondante acqua al fine di rimuovere la maggior parte dello sporco;
2. successivo utilizzo di detergenti domestici per completare la rimozione dello sporco;
3. risciacquo, dopo detersione, con acqua;
4. disinfezione: si può utilizzare la comune candeggina (in commercio ad una concentrazione al 5%) da preparare in diluizione 1:10 (100 cc. di prodotto diluito in 1 litro d'acqua) - durante questa operazione è meglio mantenere ben areati gli ambienti perché i vapori possono essere irritanti;
5. eventuale risciacquo finale per rimuovere il disinfettante residuo, dopo un tempo di contatto di 30 minuti;
6. lasciare asciugare le superfici prima del riutilizzo degli ambienti.

TETANO

È molto importante **valutare il rischio di infezione tetanica, specie in caso di lesioni cutanee e nelle persone anziane, ricorrendo alla profilassi vaccinale** che, se necessaria in base alla storia vaccinale del soggetto, può essere, come sempre, eseguita gratuitamente presso le sedi vaccinali distrettuali.

LEPTOSPIROSI

Il rischio di contrarre la leptospirosi è dovuto al **contatto di parti del corpo scoperte, non protette da idonei indumenti o mezzi di protezione, esclusivamente con acque fortemente contaminate** da urine di topo infette.

È importante tener presente che nella maggior parte dei casi questa malattia è ben curabile e non ha particolare gravità; una pronta diagnosi e terapia permettono una completa guarigione.

La probabilità che si possano verificare casi di malattia deve essere considerata estremamente scarsa. **La malattia, che si manifesta al suo esordio con febbre elevata, compare generalmente tra i 2 e 20 giorni dall'esposizione al contagio, più facilmente tra 5 e 14 giorni.**

Non c'è rischio di trasmissione dell'infezione da una persona all'altra.

Per scrupolo e cautela è **comunque raccomandabile non trascurare l'eventuale comparsa di disturbi** (febbre elevata) **nelle 3 settimane successive all'ultima esposizione** (contatto con acque contaminate) e **consultare prontamente il proprio medico curante.**

Per informazioni

contattare l'UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 8 "Berica"
 tel. **0444-752221** (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00)
 e mail: segreteria.sisp@aulss8.veneto.it - pec: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it