

**IL RISCHIO DI INFEZIONE  
DIMINUISCE  
SIGNIFICATIVAMENTE  
CON LA VACCINAZIONE!  
LE VACCINAZIONI  
RACCOMANDATE SONO  
OFFERTE GRATUITAMENTE!**

- ▶ In occasione della vaccinazione portare la documentazione relativa a precedenti vaccinazioni e la documentazione clinica (eventuale lettera di dimissione, referti delle visite specialistiche, ed eventuali recenti esami del sangue).
- ▶ Per prenotare, spostare o disdire l'appuntamento, si raccomanda di telefonare o scrivere ai contatti riportati sul retro.
- ▶ La proposta vaccinale potrebbe variare per coloro che hanno già ricevuto alcune vaccinazioni per età o per altre condizioni di rischio.

**Per informazioni**  
scansiona il QR CODE  
o vai al sito:  
**Ambulatorio di  
Vaccinazione  
soggetti fragili,  
immunodepressi,  
categorie a rischio -  
AULSS8**



**VIVO  
BENE  
VENETO** Piano  
Regionale  
Prevenzione  
del Veneto

REGIONE DEL VENETO



ULSS8  
BERICA

**AMBULATORI AD ACCESSO SOLO PREVIO  
APPUNTAMENTO**

**SEDE DI VICENZA - DISTRETTO EST**

Indirizzo **OSPEDALE SAN BORTOLO** Area E - Piano Terra  
Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Contatti ☎ 0444 752218  
dalle 12.00 alle 13.00  
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì  
✉ [sisp.vicenza@aulss8.veneto.it](mailto:sisp.vicenza@aulss8.veneto.it)

**SEDE DI ARZIGNANO - DISTRETTO OVEST**

Indirizzo **SEDE SISP** DI ARZIGNANO  
Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano

Contatti ☎ 0444 708673  
dalle ore 12.30 alle ore 13.30  
dal Lunedì al Venerdì  
✉ [sisp.arzignano@aulss8.veneto.it](mailto:sisp.arzignano@aulss8.veneto.it)

**VACCINAZIONI  
IN CASO DI  
INSUFFICIENZA RENALE  
CRONICA E  
SINDROME NEFROSICA**

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
UOC SISP

SERVIZIO IGIENE E SANITA'  
PUBBLICA DI ARZIGNANO  
Via Kennedy, 2  
36071 Arzignano



la vaccinazione  
delle persone a rischio  
per patologia

# LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE IN INSUFFICIENZA RENALE CRONICA E SINDROME NEFROSICA

**Più vaccini, più protezione!  
CO-SOMMINISTRAZIONE IN UNA SOLA  
SEDUTA = OPPORTUNITÀ**

- ▶ Le infezioni sono una delle principali cause di complicanze e mortalità tra i pazienti con malattia renale cronica. I vaccini possono aiutare a prevenirne molte.
- ▶ Se il ciclo vaccinale viene completato prima del trapianto, non deve essere ripetuto dopo il trapianto.
- ▶ Nei pazienti candidati al trapianto di rene, i vaccini necessari devono essere somministrati il prima possibile e almeno quattro settimane prima del trapianto. Le risposte ai vaccini possono essere più attenuate dopo il trapianto quando il paziente è immunosoppresso.

## VACCINO PER

## PER PREVENIRE

## DOSI DI VACCINO

### PNEUMOCOCCO

ALCUNI TIPI DI POLMONITE, INFEZIONI DIFFUSE E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE (PCV20)

### HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

MENINGITI, POLMONITI E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE

### MENINGOCOCCO B

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO B

DUE O TRE DOSI A SECONDA DEL TIPO DI VACCINO

### MENINGOCOCCO A-C-W-Y

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO A-C-W-Y

UNA DOSE

### EPATITE B

EPATITI DA VIRUS HBV E COMPLICANZE (CIRROSI, TUMORE EPATICO)

TRE O QUATTRO DOSI CON VACCINI POTENZIATI

### MORBILLO, PAROTITE ROSOLIA \*

QUESTE PATOLOGIE POTENZIALMENTE EPIDEMICHE CHE POSSONO DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI

### VARICELLA \*

L'INFEZIONE PRIMITIVA DA VARICELLA, CHE PUÒ DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI

### HERPES ZOSTER

LA RIATTIVAZIONE DEL VIRUS VARICELLA (FUOCO DI SANT'ANTONIO) E LA NEURALGIA POST-ERPETICA

DUE DOSI (RICOMBINANTE)

### DIFTERITE TETANO E PERTOSSE

TETANO, DIFTERITE (ENDEMICA IN MOLTI PAESI), PERTOSSE (PERICOLOSA PER I SOGGETTI FRAGILI, E PER I NEONATI)

VERIFICA DEL CICLO BASE E RICHIAMI

\* Controindicato in corso di immunosoppressione severa

## QUANDO INIZIARE IL PERCORSO VACCINALE?

- il prima possibile dalla diagnosi e possibilmente prima del trapianto
- il prima possibile in soggetti dializzati
- ▶ La tempistica della vaccinazione è condizionata dalla situazione clinica e dal trattamento.

- ▶ I pazienti fragili sono a rischio di malattia severa dovuta ai virus che causano **INFLUENZA** e **COVID-19**, soprattutto se immunosoppressi. Sono due infezioni virali prevenibili con le vaccinazioni annuali.

- ▶ VACCINAZIONE DEI **CONTATTI STRETTI** DEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO. Alcune vaccinazioni possono essere d'aiuto nel proteggere indirettamente fragili e neonati (*Cocooning*, o strategia del bozzolo)

**PARLANE CON IL TUO MEDICO!**

**SARANNO CONSIGLIATE DAGLI  
OPERATORI AL MOMENTO  
DELL'ACCESSO IN AMBULATORIO!**