

**IL RISCHIO DI INFEZIONE
DIMINUISCE
SIGNIFICATIVAMENTE
CON LA VACCINAZIONE!
LE VACCINAZIONI
RACCOMANDATE SONO
OFFERTE GRATUITAMENTE!**

- ▶ In occasione della vaccinazione portare la documentazione relativa a precedenti vaccinazioni e la documentazione clinica (eventuale lettera di dimissione, referti delle visite specialistiche, ed eventuali recenti esami del sangue).
- ▶ Per prenotare, spostare o disdire l'appuntamento, si raccomanda di telefonare o scrivere ai contatti riportati sul retro.
- ▶ La proposta vaccinale potrebbe variare per coloro che hanno già ricevuto alcune vaccinazioni per età o per altre condizioni di rischio.

Per informazioni
scansiona il QR CODE
o vai al sito:
**Ambulatorio di
Vaccinazione
soggetti fragili,
immunodepressi,
categorie a rischio -
AULSS8**



REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

**AMBULATORI AD ACCESSO SOLO PREVIO
APPUNTAMENTO**

SEDE DI VICENZA - DISTRETTO EST

Indirizzo **OSPEDALE SAN BORTOLO** Area E - Piano Terra
Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Contatti ☎ 0444 752218
dalle 12.00 alle 13.00
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
✉ sisp.vicenza@aulss8.veneto.it

SEDE DI ARZIGNANO - DISTRETTO OVEST


Indirizzo **SEDE SISP** DI ARZIGNANO
Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano

Contatti ☎ 0444 708673
dalle ore 12.30 alle ore 13.30
dal Lunedì al Venerdì
✉ sisp.arzignano@aulss8.veneto.it

**VACCINAZIONI
IN CASO DI
NEOPLASIA
EMATOLOGICA**

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
UOC SISP

SERVIZIO IGIENE E SANITA'
PUBBLICA DI ARZIGNANO
Via Kennedy, 2
36071 Arzignano



la vaccinazione
delle persone a rischio
per patologia

LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELLA NEOPLASIA EMATOLOGICA

**Più vaccini, più protezione!
CO-SOMMINISTRAZIONE IN UNA SOLA
SEDUTA = OPPORTUNITÀ**

► Le malattie mielo-proliferative e displastiche, i Linfomi di Hodgkin e non Hodgkin, il mieloma multiplo, portano a immunocompromissione, in misura maggiore quando in terapia o all'avvio del percorso terapeutico per un trapianto.

► Le infezioni in questi pazienti sono gravi e le terapie antimicrobiche sono meno efficaci.
► Le vaccinazioni prevencono le infezioni e vengono somministrate previa valutazione della chemioterapia, al fine di innescare la migliore risposta immunitaria ottenibile.

VACCINO PER

PER PREVENIRE

DOSI DI VACCINO

PNEUMOCOCCO

ALCUNI TIPI DI POLMONITE, INFEZIONI DIFFUSE E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE (PCV20) + UNA DOSE (PPSV23)

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

MENINGITI, POLMONITI E LE COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE

MENINGOCOCCO A-C-W-Y

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO A-C-W-Y

UNA DOSE
(+ EVENTUALE RICHIAMO A 8 SETTIMANE)

MENINGOCOCCO B

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO B

DUE O TRE DOSI,
A SECONDA DEL TIPO DI VACCINO

PAPILLOMAVIRUS

TUMORI GENITALI NELLA DONNA E NELL'UOMO, TUMORI TESTA-COLLO E CONDILOMI

TRE DOSI

MORBILLO, PAROTITE ROSOLIA *

QUESTE PATOLOGIE POTENZIALMENTE EPIDEMICHE CHE POSSONO DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI,
A PARTIRE DAI 24 MESI DAL FINE TERAPIA

VARICELLA *

L'INFEZIONE PRIMITIVA DA VARICELLA, CHE PUÒ DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI,
A PARTIRE DAI 24 MESI DAL FINE TERAPIA

HERPES ZOSTER

LA RIATTIVAZIONE DEL VIRUS VARICELLA (FUOCO DI SANT'ANTONIO) E LA NEVRALGIA POST-ERPETICA

DUE DOSI (RICOMBINANTE)

DIFTERITE TETANO E PERTOSSE

TETANO, DIFTERITE (ENDEMICIA IN MOLTI PAESI), PERTOSSE (PERICOLOSA PER I SOGGETTI FRAGILI, E PER I NEONATI)

DUE DOSI

** Controindicato in corso di immunosoppressione severa*

QUANDO INIZIARE IL PERCORSO VACCINALE?

- alla diagnosi di malattia, prima dell'avvio della chemioterapia;
- a tre-sei mesi dalla fine della chemioterapia;
- durante una terapia cronica, valutando le opportunità vaccinali in base al grado di immunosoppressione.

► I pazienti fragili sono a rischio di malattia severa dovuta ai virus che causano **INFLUENZA** e **COVID-19**, soprattutto se immunosoppressi. Sono due infezioni virali prevenibili con le vaccinazioni annuali.

► **VACCINAZIONE DEI CONTATTI STRETTI DEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO**
Alcune vaccinazioni possono essere d'aiuto nel proteggere indirettamente fragili e neonati (*Cocooning*, o strategia del bozzolo)

PARLANE CON IL TUO MEDICO!

SARANNO CONSIGLIATE DAGLI OPERATORI AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN AMBULATORIO!