

**IL RISCHIO DI INFEZIONE
DIMINUISCE
SIGNIFICATIVAMENTE
CON LA VACCINAZIONE!
LE VACCINAZIONI
RACCOMANDATE SONO
OFFERTE GRATUITAMENTE!**

- ▶ In occasione della vaccinazione portare la documentazione relativa a precedenti vaccinazioni e la documentazione clinica (eventuale lettera di dimissione, referti delle visite specialistiche, ed eventuali recenti esami del sangue).
- ▶ Per prenotare, spostare o disdire l'appuntamento, si raccomanda di telefonare o scrivere ai contatti riportati sul retro.
- ▶ La proposta vaccinale potrebbe variare per coloro che hanno già ricevuto alcune vaccinazioni per età o per altre condizioni di rischio.

Per informazioni
scansiona il QR CODE
o vai al sito:
**Ambulatorio di
Vaccinazione
soggetti fragili,
immunodepressi,
categorie a rischio -
AULSS8**



**VIVO
BENE
VENETO** Piano
Regionale
Prevenzione
del Veneto

REGIONE DEL VENETO



**ULSS8
BERICA**

**AMBULATORI AD ACCESSO SOLO PREVIO
APPUNTAMENTO**

SEDE DI VICENZA - DISTRETTO EST

Indirizzo **OSPEDALE SAN BORTOLO** Area E - Piano Terra
Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Contatti ☎ 0444 752218
dalle 12.00 alle 13.00
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
✉ sisp.vicenza@aulss8.veneto.it

SEDE DI ARZIGNANO - DISTRETTO OVEST

Indirizzo **SEDE SISP DI ARZIGNANO**
Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano


Contatti ☎ 0444 708673
dalle ore 12.30 alle ore 13.30
dal Lunedì al Venerdì
✉ sisp.arzignano@aulss8.veneto.it

**VACCINAZIONI
IN CASO DI**

**NEOPLASIA
SOLIDA**

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
UOC SISP

SERVIZIO IGIENE E SANITA'
PUBBLICA DI ARZIGNANO
Via Kennedy, 2
36071 Arzignano



la vaccinazione
delle persone a rischio
per patologia

LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELLE NEOPLASIE SOLIDE

► Il processo neoplastico può alterare alcune funzioni e meccanismi fisiologici, comportando un aumentato rischio di infezione.

► Il sistema immunitario dei pazienti affetti da neoplasia solida può essere ulteriormente debilitato in base all'età del paziente, al tipo di neoplasia, alla sua stadiazione e tipologia e all'intensità del trattamento.

Più vaccini, più protezione!
CO-SOMMINISTRAZIONE IN UNA SOLA SEDUTA = OPPORTUNITÀ

VACCINO PER	PER PREVENIRE	DOSI DI VACCINO	
		PRE TRATTAMENTO	POST TRATTAMENTO
PNEUMOCOCCO	ALCUNI TIPI DI POLMONITE, INFEZIONI DIFFUSE E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO	UNA (PCV20) + UNA (PPSV23)	DA 6 MESI, UNA DOSE (PCV20) DA 14 MESI, UNA DOSE (PPSV23)
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B	MENINGITI, POLMONITI E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO	UNA DOSE	DA 6 MESI, UNA DOSE
MENINGOCOCCO A-C-W-Y	MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO A-C-W-Y	UNA DOSE	DA 6 MESI, UN RICHIAMO
MENINGOCOCCO B	MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO B	DUE O TRE DOSI A SECONDA DEL TIPO DI VACCINO	DA 6 MESI, TERZA DOSE
MORBILLO, PAROTITE ROSOLIA *	QUESTE PATOLOGIE POTENZIALMENTE EPIDEMICHE CHE POSSONO DARE COMPLICANZE SEVERE	DUE DOSI	DA 7 MESI, UNA DOSE
VARICELLA *	L'INFEZIONE PRIMITIVA DA VARICELLA, CHE PUÒ DARE COMPLICANZE SEVERE	DUE DOSI	DA 7 MESI, UNA DOSE
HERPES ZOSTER	LA RIATTIVAZIONE DEL VIRUS VARICELLA (FUOCO DI SANT'ANTONIO) E LA NEURALGIA POST-ERPETICA	DUE DOSI	DA 3 MESI, DUE DOSI (RICOMB.)
EPATITE B	EPATITI DA VIRUS HBV E COMPLICANZE (CIRROSI, TUMORE EPATICO)	VERIFICA DEL CICLO BASE E SIEROLOGIA	
DIFTERITE TETANO E PERTOSSE	TETANO, DIFTERITE (ENDEMICIA IN MOLTI PAESI), PERTOSSE (PERICOLOSA PER I SOGGETTI FRAGILI, E PER I NEONATI)	VERIFICA DEL CICLO BASE E RICHIAMI A 6 MESI POST TERAPIA	

* Controindicato in corso di immunosoppressione severa

QUANDO INIZIARE IL PERCORSO VACCINALE?

- alla diagnosi di malattia, portando a termine il percorso almeno 2 settimane prima dell'avvio del trattamento;
- a partire dai 3 mesi post-trattamento.

► I pazienti fragili sono a rischio di malattia severa dovuta ai virus che causano **INFLUENZA** e **COVID-19**, soprattutto se immunosoppressi. Sono due infezioni virali prevenibili con le vaccinazioni annuali.

► **VACCINAZIONE DEI CONTATTI STRETTI DEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO**
Alcune vaccinazioni possono essere d'aiuto nel proteggere indirettamente fragili e neonati (*Cocooning*, o strategia del bozzolo)

PARLANE CON IL TUO MEDICO!

SARANNO CONSIGLIATE DAGLI OPERATORI AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN AMBULATORIO!