

**IL RISCHIO DI INFEZIONE  
DIMINUISCE  
SIGNIFICATIVAMENTE  
CON LA VACCINAZIONE!  
LE VACCINAZIONI  
RACCOMANDATE SONO  
OFFERTE GRATUITAMENTE!**

- ▶ In occasione della vaccinazione portare la documentazione relativa a precedenti vaccinazioni e la documentazione clinica (eventuale lettera di dimissione, referti delle visite specialistiche, ed eventuali recenti esami del sangue).
- ▶ Per prenotare, spostare o disdire l'appuntamento, si raccomanda di telefonare o scrivere ai contatti riportati sul retro.
- ▶ La proposta vaccinale potrebbe variare per coloro che hanno già ricevuto alcune vaccinazioni per età o per altre condizioni di rischio.

Per informazioni  
scansiona il QR CODE  
o vai al sito:  
**Ambulatorio di  
Vaccinazione  
soggetti fragili,  
immunodepressi,  
categorie a rischio -  
AULSS8**



**VIVO  
BENE  
VENETO** Piano  
Regionale  
Prevenzione  
del Veneto

REGIONE DEL VENETO



**ULSS8  
BERICA**

**AMBULATORI AD ACCESSO SOLO PREVIO  
APPUNTAMENTO**

**SEDE DI VICENZA - DISTRETTO EST**

Indirizzo **OSPEDALE SAN BORTOLO** Area E - Piano Terra  
Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Contatti ☎ 0444 752218  
dalle 12.00 alle 13.00  
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì  
✉ [sisp.vicenza@aulss8.veneto.it](mailto:sisp.vicenza@aulss8.veneto.it)

**SEDE DI ARZIGNANO - DISTRETTO OVEST**

Indirizzo **SEDE SISP** DI ARZIGNANO  
Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano


Contatti ☎ 0444 708673  
dalle ore 12.30 alle ore 13.30  
dal Lunedì al Venerdì  
✉ [sisp.arzignano@aulss8.veneto.it](mailto:sisp.arzignano@aulss8.veneto.it)

## VACCINAZIONI IN CASO DI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO

RENE, CUORE, FEGATO, POLMONI, PANCREAS O INTESTINO

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
UOC SISP

SERVIZIO IGIENE E SANITA'  
PUBBLICA DI ARZIGNANO  
Via Kennedy, 2  
36071 Arzignano



la vaccinazione  
delle persone a rischio  
per patologia

# LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NEL TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO

Rene, cuore, fegato, polmoni, pancreas o intestino

- ▶ Le infezioni nei pazienti sottoposti a trapianto possono essere molto gravi e talvolta fatali. Il trattamento di queste infezioni con antibiotici non sempre funziona bene come nelle persone con un sistema immunitario normale.
- ▶ La vaccinazione è un modo semplice per difendersi, anche se i pazienti immunocompromessi possono sviluppare risposte immunitarie meno protettive dopo la vaccinazione.
- ▶ Non c'è associazione causale tra le vaccinazioni e il rigetto d'organo.

**Più vaccini, più protezione!**  
CO-SOMMINISTRAZIONE IN UNA SOLA SEDUTA = OPPORTUNITÀ

## VACCINO PER

## PER PREVENIRE

## DOSI DI VACCINO PRE TRAPIANTO POST TRAPIANTO

VACCINO PER	PER PREVENIRE	PRE TRAPIANTO	POST TRAPIANTO
<b>PNEUMOCOCCO</b>	ALCUNI TIPI DI POLMONITE, INFEZIONI DIFFUSE E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO	UNA (PCV20) + UNA (PPSV23)	DA 6 MESI, UNA DOSE (PCV20) + UNA DOSE (PPSV23)
<b>HAEMOPHILUS INFLUENZAE B</b>	MENINGITI, POLMONITI E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO	UNA DOSE	/
<b>MENINGOCOCCO A-C-W-Y</b>	MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO A-C-W-Y	UNA DOSE	DA 4 MESI, UN RICHIAMO
<b>MENINGOCOCCO B</b>	MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO B	DUE DOSI	DA 4 MESI, UN RICHIAMO
<b>EPATITE A</b>	L'INFEZIONE DA VIRUS HAV E LE SUE COMPLICANZE (EPATITE ACUTA)	DA VALUTARE	DA 6 MESI, DUE DOSI
<b>EPATITE B</b>	EPATITI DA VIRUS HBV E COMPLICANZE (CIRROSI, TUMORE EPATICO)	SCHEDULA ACCELERATA	DA 6 MESI, TRE DOSI
<b>PAPILLOMAVIRUS</b>	TUMORI GENITALI NELLA DONNA E NELL'UOMO, TUMORI TESTA-COLLO E CONDILOMI	/	DA 7 MESI, TRE DOSI
<b>MORBILLO, PAROTITE ROSOLIA *</b>	QUESTE PATOLOGIE POTENZIALMENTE EPIDEMICHE CHE POSSONO DARE COMPLICANZE SEVERE	DUE DOSI	CONTROINDICATO
<b>VARICELLA *</b>	L'INFEZIONE PRIMITIVA DA VARICELLA, CHE PUÒ DARE COMPLICANZE SEVERE	DUE DOSI	CONTROINDICATO
<b>HERPES ZOSTER</b>	LA RIATTIVAZIONE DEL VIRUS VARICELLA (FUOCO DI SANT'ANTONIO) E LA NEURALGIA POST-ERPETICA	DUE DOSI RICOMBINANTE	DA 4 MESI, DUE DOSI (RICOMB.)
<b>DIFTERITE TETANO E PERTOSSE</b>	TETANO, DIFTERITE (ENDEMICA IN MOLTI PAESI), PERTOSSE (PERICOLOSA PER I SOGGETTI FRAGILI, E PER I NEONATI)	VERIFICA DEL CICLO BASE E RICHIAMI	

\* Controindicato in corso di immunosoppressione severa

## QUANDO INIZIARE IL PERCORSO VACCINALE?

in attesa di trapianto o quattro-sei mesi dopo il trapianto

- ▶ La tempistica della vaccinazione è condizionata dal trattamento immunomodulante anti-rigetto.

- ▶ I pazienti fragili sono a rischio di malattia severa dovuta ai virus che causano INFLUENZA e COVID-19, soprattutto se immunosoppressi. Sono due infezioni virali prevenibili con le vaccinazioni annuali.

- ▶ **VACCINAZIONE DEI CONTATTI STRETTI DEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO**  
Alcune vaccinazioni possono essere d'aiuto nel proteggere indirettamente fragili e neonati (*Cocooning*, o strategia del bozzolo)

**PARLANE CON IL TUO MEDICO!**

**SARANNO CONSIGLIATE DAGLI OPERATORI AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN AMBULATORIO!**