

CODICE MAGAZZINO		098774	
PRINCIPIO ATTIVO		Clorexidina gluconato (0,015 g) Cetrimide (0,150 g)	
NOME COMMERCIALE ¹		FARVICETT 0,015%+0,15% Soluzione cutanea	
INDICAZIONI D'USO		Pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni). Pulizia ed antisepsi esterna in ostetricia, ginecologia ed urologia. Disinfezione della cute integra.	
MODALITÀ' D'USO		Solubilizzare il preparato della busta monodose secondo le istruzioni. Tamponare la cute con cotone abbondantemente imbevuto di soluzione. Ripetere, se necessario, l'operazione per un massimo di 4-5 volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.	
AVVERTENZE SICUREZZA		<p>Conservare nella confezione originale. Il prodotto è solo per uso esterno. Non usare per trattamenti prolungati. Non applicare con bendaggio occlusivo. Dopo l'applicazione evitare l'esposizione alla luce del sole. Evitare il contatto con occhi e orecchi. Non ingerire. Rimuovere tutti i materiali impregnati (anche teli chirurgici o camici) prima di procedere con l'intervento. Non usare quantità eccessive del prodotto, evitate che la soluzione si accumuli nelle pieghe cutanee o sotto il corpo del paziente o goccioli sulle lenzuola o altro materiale a diretto contatto con il paziente. Incompatibile con detergenti anionici, saponi, agenti emulsionanti. La clorexidina, in particolare, è incompatibile con: borati, bicarbonati, carbonati, cloruri, citrati, fosfati, nitrati, solfati in quanto forma dei sali poco solubili. I sali di clorexidina sono inattivati dal sughero. La validità della confezione integra è di 3 anni.</p>	
PITTOGRAMMI DI RISCHIO			
DPI			
SPANDIMENTO		 KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro  KIT AVANZATO Per quantità superiori al litro	

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.