



CODICE MAGAZZINO		107E1259		
PRINCIPIO ATTIVO		Clorexidina digluconato (2 g) Alcool isopropilico (62 g, pari a 70% v/v)		
NOME COMMERCIALE ¹		NEXCLOREX 2% PREP		
INDICAZIONI D'USO				<p>Disinfezione del punto di inserzione dei cateteri venosi ed arteriosi, periferici e centrali.</p> <p>Disinfezione di aree cutanee per prelievi, biopsie, pratica per le iniezioni, ecc.</p> <p>Preparazione del campo operatorio per l'antisepsi dell'area cutanea sede dell'intervento chirurgico.</p>
MODALITÀ D'USO				<p>Premere la parte superiore del tappo dispenser ed agitare bene per circa 30 secondi. La soluzione miscelata con colorante deve essere utilizzata entro 72 ore.</p> <p>Applicare sulla cute direttamente o mediante tampone imbevuto, frizionando la parte interessata ed anche quella perifocale. Lasciare asciugare.</p>
AVVERTENZE SICUREZZA				<p>Tenere ben chiuso, al fresco ed all'asciutto, lontano da fiamme, scintille ed ogni altra fonte di calore.</p> <p>Evitare le alte temperature.</p> <p>Evitare il contatto con gli occhi.</p> <p>Non dispensare nell'ambiente.</p> <p>La validità della confezione integra è di 24 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 <p>H226 H319 H336 H412</p>			
DPI				
SPANDIMENTO				<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO Per quantità superiori al litro</p>

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.