

CODICE MAGAZZINO		099107E1259	
PRINCIPIO ATTIVO		Clorexidina digluconato ed alcool etilico 70%	
NOME COMMERCIALE <sup>1</sup>		CLOREXINAL 2%	
INDICAZIONI D'USO		Clorexinal 2% è indicato per la disinfezione di cute integra, l'antisepsi del campo operatorio e per la frizione chirurgica.	
MODALITÀ D'USO		<ul style="list-style-type: none"> <li>Per la disinfezione delle aree cutanee e del campo operatorio, applicare direttamente Clorexinal 2% sulla cute o mediante un tampone di cotone imbevuto, frizionando la parte interessata e quella perifocale per 30 secondi. Lasciare asciugare.</li> <li>Per la frizione chirurgica delle mani, utilizzare 3 ml di Clorexinal 2% e frizionare per 45 secondi. Ripetere una seconda volta per un tempo complessivo di 90 secondi. Lasciare asciugare.</li> </ul>	
AVVERTENZE SICUREZZA			
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 		<p>Non disperdere nell'ambiente. Provoca grave irritazione oculare. Il prodotto è infiammabile. Conservare il prodotto ben chiuso lontano da fiamme e scintille e da qualsiasi fonte di calore, ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C. La validità del prodotto in confezione integra è di 3 anni.</p>
	<p>H226                      H319                                     H412</p>		
DPI	Durante l'uso normale del prodotto non sono necessarie particolari protezioni.		
SPANDIMENTO		<div style="border: 2px solid yellow; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"><b>KIT STANDARD</b></div> Per quantità inferiori al litro <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"><b>KIT AVANZATO</b> </div> Per quantità superiori al litro	

<sup>1</sup> La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.